

# 人類乳突病毒(HPV)疫苗接種後應注意事項

## 四價人類乳突病毒(HPV)疫苗接種後可能發生的反應：

- 四價人類乳突病毒疫苗是含第6、11、16及18基因型類病毒微粒之疫苗，安全性符合美國、歐洲、澳洲、台灣等世界各國衛生主管機關的認可，其常見的不良反應為頭痛、發燒、噁心、暈眩及注射部位的反應(疼痛、腫脹、紅斑、搔癢及瘀傷)等。不良反應多為輕到中度，一般而言會自行緩解。
- 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如氣喘、呼吸困難、抽搐等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處理。

## 接種四價人類乳突病毒(HPV)疫苗後注意事項：

- 注射後應於醫療院所休息觀察30分鐘，無任何不適症狀後才離開。
- 曾於接種一劑疫苗後出現過敏症狀者，不可再接種後續劑次的疫苗。
- 完成疫苗接種後，雖可降低感染子宮頸癌的機會，但民眾還是需要定期參加子宮頸抹片檢查，以維護健康。
- 預防接種後，請多喝些開水、多休息，如有特殊反應時，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處理。
- 請家長妥善保存本預防接種紀錄手冊，做每次接種紀錄之用。

## 本市提供的四價人類乳突病毒(HPV)疫苗接種時程：

- 四價HPV疫苗共需接種三劑。第一劑：自行選定的一個日期，開始接種第1劑疫苗，間隔2個月接種第2劑，再間隔4個月接種第3劑（高三女生自104年3月8日起至104年6月30日止，完成第1劑疫苗接種後，即可保有後續2、3劑疫苗接種資格）。

人類乳突病毒(HPV)疫苗諮詢專線：0809-008-003